## 定期の予防接種(その1)

対象疾病	ワクチン	接 種						
			対象者	標準的な接種期間	回数	間隔	接種量	方法
ジフテリア 百日せき 破傷風	<ul><li>沈降精製百日せき</li><li>ジフテリア破傷風</li><li>ワクチン(DPT)</li></ul>	1期初回	生後3月から生後90月 までのお子様	生後3月に達した時から生後12月まで	3回	20 日から 56 日まで	各 0.5ml	皮下
	又は 沈降ジフテリア破 傷風混合トキソイ ド(DT)	1 期追加	生後3月から生後90月 までのお子様(1期初回 接種(3回)終了後、6月以 上の間隔をおく)	1 期初回接種(3 回)終 了後 12 月になった時 から 18 月まで	1回		0.5ml	
	沈降ジフテリア破 傷風混合トキソイ ド(DT)	2 期	11 歳以上 13 歳未満のお 子様		1回		0.1ml	
急性灰白髄炎	経口生ポリオワク	生後3月	から生後90月までのお子	生後3月から生後18	2 回	41 日以上	各 0.05ml	経口
(ポリオ)	チン	様		月まで				
麻しん風しん	乾燥弱毒生麻しん 風しん混合ワクチ ン(MR)	1期	生後 12 月から生後 2 4 月までのお子様					皮下

	又は	2期	5歳以上7歳未満のお子		1回	]	0.5ml	[]
	乾燥弱毒生麻しん		様で、小学校入学の1年					
	(M)		前の日から入学の前日					
	乾燥弱毒生風しん		まで					
	ワクチン(R)							
		3 期	13 歳となる日の属する		1回		0.5ml	
			年度の初日から年度の					
			末日まで					
		4期	18 歳となる日の属する		1回		0.5ml	
			年度の初日から年度の					
			末日まで					
日本脳炎	乾燥細胞培養日本	1 期初	生後 6 月から生後 90 月	3 歳に達した時から	2 回	6 日から	(3歳以上)	皮下
	脳炎ワクチン	回	までのお子様	4歳になるまで		28 日まで	各 0.5ml	
							(3歳未満)	
							各 0.25ml	
		1 期追	生後 6 月から生後 90 月	4 歳に達した時から	1回		(3歳以上)	
		加	までのお子様(1 期初回	5歳になるまで			各 0.5ml	
			終了後おおむね 1 年お				(3歳未満)	
			<)				各 0.25ml	
		2期	9 歳以上 13 歳未満のお	9 歳に達した時から	1回		0.5ml	
			子様	10 歳になるまで				

結核	BCG ワクチン	生後6月までのお子様	1回	所定のス	経皮
				ポイトで	
				滴下	

## 定期の予防接種(二類疾病)

対象疾病	ワクチン	接種			
		対象者	回数	接種量	方法
季節性	インフルエンザ	・65 歳以上の方	(毎年度)	0.5ml	皮下
インフルエンザ	HA ワクチン	・60 歳以上 65 未満で	1回		
		あって内臓機能にあ			
		る程度の障害のある			
		方			

## 主な任意の予防接種

種類	接種						
	対象年齢	回数	間隔	接種量	方法		
季節性	二類の対象者を除く	2 旦	1~4 週間	1 歳未満 0.1ml	皮下		
インフルエンザ	全年齢	(13 歳)未満	(免疫効果を考慮す	1~6 歳未満 0.2ml			
		1回または2回	ると4週間が良い)	6~13 歳未満 0.3ml			
		(13 歳以上)		13 歳以上 0.5ml			
おたふくかぜ	1 歳以上(生後 24~	1 回		0.5ml	皮下		

	60 か月の間がおスス				
	メ)				
水痘	1歳以上	1回		0.5ml	皮下
B型肝炎	(1)HBs 抗原陽性の母	3 回	生後 2.3.5 か月	各 0.25ml	皮下
	親から生まれた HBs				
	抗原陰性の乳児				
	(2)ハイリスク者	3 回	4週間隔で2回、更に	各 0.5ml(10 歳未満は	皮下又は
	医療従事者、透析を受		20~24 週後に1回	0.25ml)	筋肉内
	けている方、海外長期				
	滞在の方				
	(3)汚染事故時	3 回	事故発生後7日以内		
			その後1カ月後及び3		
			~6 か月後		
多価肺炎球菌夾膜ポ	2 歳以上のハイリス	1回		0.5ml	筋肉内又は
リサッカライド	ク者、65 歳以上の高				皮下
	齢者				
A型肝炎	16 歳以上	初回2回	2~4 週間	各 0.5ml	筋肉内又は
		追加	初回接種後 24 週後		皮下
黄熱	9か月以上	1回		0.5ml	皮下
狂犬病	全年齢	予防目的3回	4週間隔で2回	各 1.0ml	皮下
			6~12 か月後 1 回		
		事故後 6 回	1回目を0日として		
			3.7.14.30.90 日		

## 予防接種の接種間隔

生ワクチン

27 目以上おく

不活化ワクチン

生ワクチン

不活化ワクチン

破傷風、三種、二種、日本脳炎、インフルエ ンザ

ヒブ、A型肝炎、B型肝炎、狂犬病、肺炎球 菌、子宮頸がん予防 不活化ワクチン

6 日以上おく

生ワクチン